

Но ме р	Заболявания
1.	<p>Заболявания на опорно – двигателната система.</p> <p>1.1. Придобит деформитет на тазобедрената става – болестта на Пертес с тежки остатъчни деформации.</p> <p>1.2. Ампутации, контрактури и анкилози – без засягане на горен крайник, включително, ползващи постоянни инвалидни колички.</p>
2.	<p>Болести на централна и периферна нервна система.</p> <p>2.1. Детска церебрална парализа и състояния след прекаран енцефалит или миелит с нормален интелект и незасегнати горни крайници, с остатъчни прояви на долна парапареза.</p> <p>2.2. Епилепсия с постоянно антиепилептично лечение, през последната една година.</p> <p>2.3. Прогресивна мускулна дистрофия, вродени миопатии, неврална мускулна атрофия и спинална мускулна атрофия.</p> <p>2.4. Миастения.</p>

3.	<p>Заболявания на бронхопулмоналната система. 3.1. След парциална или тотална резекция на единия бял дроб вследствие на системни заболявания на бронхобелодробната система със степенно проявена дихателна недостатъчност.</p>
4.	<p>Заболявания на ендокринната система. 4.1. Инсулинозависим захарен диабет.</p>
5.	<p>Психични заболявания. 5.1. Циклофрения и шизофрения в ремисия.</p>
6.	<p>Болести на отделителната система. 6.1. Хронична и терминална бъбречна недостатъчност.</p>
7.	<p>Болести на слуховия апарат довели до трайна загуба на слуха.</p>
8.	<p>Болести на сърцето, съдовете и кръвообращението. 8.1. След сърдечна операция за вродено или придобито сърдечно заболяване с остатъчни хемодинамични нарушения. 8.2. Провеждащи антикоагулантно лечение във връзка с инплантирана клапна протеза. 8.3. С инплантиран постоянен електрокардиостимулатор.</p>

9.	Злокачествени новообразувания – след проведено консервативно или оперативно лечение в стадии на дълготрайна клинична ремисия.
10.	Пациенти с трансплантация.
11.	<p>Болести на зрителния анализатор.</p> <p>11.1. Неусложнена двучна миопия над 6,0 Д при зрителна острота на двете очи от 0,1 до 0,3.</p> <p>11.2. Вродена ювенилна глаукома със зрителна острота на двете очи от 0,1 до 0,3.</p> <p>11.3. Двучна афакия със зрителна острота на афактичното око от 0,1 до 0,3 с контактна леща или интраокуларна леща.</p>